

BAREM CORECTARE

VARIANTA 1

Concurs pentru ocuparea postului de asistent medical

1. După administrarea medicamentelor, în sacul conjunctival pot apărea următoarele reacții locale:

- a. congestie
- b. lăcrimare, prurit
- c. ambele variante sunt corecte

2. Administrarea medicamentelor pe cale nazală se face cu pacientul așezat în poziție de:

- a. decubit dorsal
- b. decubit lateral stang
- c. ortostatism cu hiperextensia capului

3. Tamponamentul nazal poate fi:

- a. anterior
- b. lateral
- c. posterior

4. În caz de astm bronșic aerosolii se administrează copilului așezat în poziție:

- a. decubit dorsal
- b. decubit lateral stâng
- c. semișezând

5. Tabloul clinic al astmului bronșic include:

- a. dispnee expiratorie, tuse, wheezing
- b. dispnee inspiratorie, tuse, wheezing
- c. dispneee, junghi toracic, febră

6. Tusea seacă iritativă este specifică:

- a. infecțiilor virale ale căilor respiratorii superioare
- b. infecțiilor bacteriene ale căilor respiratorii superioare
- c. bronșitei cronice

7. Tusea productivă cu expectorații apare de obicei în:

- a. bronșita cronică
- b. laringita cronică
- c. traheobronșită acută virală

8. Acidocetoza diabetică la copil se manifestă prin:

- a. obnubilare
- b. halenă acetonemică
- c. oligurie

9. Paralizia jumătății inferioare a corpului se numește:

- a. paraplegie
- b. hemiplegie
- c. tetraplegie

10. Virusurile:

- a. se văd doar la microscopul electronic
- b. dețin doar ARN
- c. sunt agenși patogeni ce au cele mai mici dimensiuni

11. Obiectivele unui pansament corect sunt:

- a. favorizarea vindecării plăgilor
- b. prevenirea infecției
- c. prevenirea tulburărilor de coagulare

12. Hipoacuzia reprezintă:

- a. scăderea acuității auditive
- b. abolirea acuității auditive
- c. ambele variante sunt corecte

13. Administrarea medicamentelor în conductul auditiv extern poate avea drept scop:

- a. obținerea unui efect terapeutic
- b. înmuierea dopului de cerumen
- c. profilactic, în vederea prevenirii otitei medii supurate

14. Administrarea medicamentelor în conductul auditiv extern respectă următoarele principii, cu excepția:

- a. se administrează soluții la temperatura corpului
- b. se administrează soluțiile medicamentoase la temperaturi scăzute pentru a preveni lezarea timpanului
- c. se administrează soluții medicamentoase la temperaturi ridicate pentru a facilita procesul de absorbție

15. La copiii preșcolari poziția vicioasă se asociază cu defomări ale coloanei vertebrale:

- a. cifoza
- b. lordoza
- c. spondiloza

16. Diagnosticul de fractură se stabilește prin:

- a. examen clinic
- b. examen radiologic
- c. examen ecografic

17. Entorsa este o afecțiune traumatică a:

- a. articulației
- b. epifizei osoase
- c. diafizei osoase

18. Simptomatologia unei luxații include:

- a. impotență funcțională
- b. deformarea regiunii
- c. subfebrilitate sau febră ridicată

19. Luxația scapulo-humerală se caracterizează prin:

- a. dureri vii
- b. febră ridicată
- c. impotență funcțională

20. Pacientul cu rujeolă prezintă:

- a. semnul Koplik
- b. semnul Pastia-Grozovici
- c. semnul Widal

21. Tabloul clinic al rujeolei cuprinde următoarele manifestări clinice:

- a. cataroculonazal și traheobronșic
- b. micropapule albe în dreptul molarilor
- c. erupție micropapuloasă aspră

22. Streptococul beta-hemolitic este agentul etiologic al:

- a. scarlatinei
- b. febrei tifoide
- c. difteriei

23. Pacientul cu scarlatină prezintă:

- a. limbă zmeurie
- b. erupție micropapuloasă
- c. ambele variante sunt corecte

24. Evoluția parotiditei endemice poate afecta:

- a. testiculele
- b. pancreasul
- c. rinichii

25. Pierderea de lichide pe cale digestivă prin vărsături și diaree duce la apariția:

- a. deshidratării izotone
- b. deshidratării hipertone
- c. deshidratării hipotone

26. În caz de corp străin laringian:

- a. se recomandă manevră Heimlich
- b. se mobilizează bolnavul în vederea eliminării spontane a corpului străin
- c. se transportă copilul la spital în poziție de decubit lateral stâng.

27. Arsura de gradul I se caracterizează prin:

- a. eritem
- b. flictenă cu lichid clar
- c. flictenă cu lichid hemoragic

28. Îngrijirea unui copil cu epistaxis presupune:

- a. așezarea copilului în decubit dorsal
- b. introducerea unei meșe nazale fără a evacua conținutul nazal
- c. compresie digitală pe nara din care curge sângele

29. Măsurile de urgență în cazul unui copil mușcat de câine includ:

- a. dezinfecție locală
- b. antialgice
- c. sutura rapidă a plăgii, în primele 60 de minute

30. În cazul unei arsuri oculare caustice se recomandă:

- a. spălarea rapidă a ochiului cu ser fiziologic
- b. instilarea unei soluții alcaline
- c. administrarea unui colir oftalmic cu antibiotic

Notă:

- *Pot fi cel mult două răspunsuri corecte;*
- *Nu se punctează dacă din două (2) răspunsuri corecte se identifică doar unul (1);*
- *Se acordă 10 puncte din oficiu.*